

全省住建系统花卉工职工岗位技能竞赛理论考试题库

一、理论知识

(一) 单项选择题

- 1、摘心可增加分枝数，使枝条充实，促进花芽分化，生产中常采用摘心处理的花卉有 ()。B
A、金鸡菊、一串红 B、小菊、一串红
C、黑心菊、小菊 D、天人菊、金鸡菊
- 2、陈旻子()成书于 1688 年，全书记载了栽花月历、栽培总论、栽培各论。B
A、《菊谱》 B、《花镜》 C、《兰谱》 D、《芍药谱》
- 3、我国十大传统名花为：梅花、牡丹、菊花、兰花、月季花、杜鹃花、山茶花、()、桂花、水仙花。D
A、睡莲 B、芍药 C、栀子花 D、荷花
- 4、()与梅、竹、菊并列，合称“四君子”。B
A 君子兰 B 兰花 C 荷花 D 桂花
- 5、菊花叶螨危害时，在防治中可选的生物农药是 ()。C
A、吡虫啉 B、氯氰菊酯 C、阿维菌素 D、印楝素·苦参乳油
- 6、福州市市树是榕树，市花是()。C
A、月季花 B、三角梅 C、茉莉花 D、水仙花
- 7、荷兰主要生产()、风信子、百合、唐菖蒲等球根花卉。B
A、朱顶红 B、郁金香 C、番红花 D、鸢尾
- 8、沙漠气候区花卉种类以()及多浆植物为主。C
A、芦荟 B、龙舌兰 C、仙人掌 D、沙漠玫瑰
- 9、产自热带气候区的兰属品种有：万代兰、()、石斛、兜兰、贝母兰。D
A、报岁兰 B、墨兰 C、寒兰 D、蝴蝶兰
- 10、有些花卉种类，在春化阶段对温度的要求不甚敏感，可在 20℃或更高的温度下通过春化阶段，进行花芽分化，如百日草、孔雀草、万寿菊、()等。C
A、波斯菊 B 仙客来 C 鸡冠花 D 报春花
- 11、花卉的繁殖可分为有性繁殖、()、孢子繁殖、和组织培养繁殖等四种类型。C
A 种子繁殖 B 扦插繁殖 C 无性繁殖 D 分生繁殖
- 12、一般花卉种子在充分干燥后密封，存放在低温()℃条件下，以减少种子的呼吸作用，保持其生活力。B
A、-5—0 B、0—5 C、5—10 D、10—15
- 13、大多数种子含水量在()间寿命最长。C
A、3~4% B、4~5% C、5~6% D、6~7%
- 14、近 20 年来，在国内外广泛应用于花卉生产中的现代产业化育苗新技术，是用一种称为“()”的容器作为工具，填充泥炭、蛭石、珍珠岩等轻质材料的育苗方式。C
A、塑料盒 B、育苗钵 C、穴盘 D、营养袋
- 15、利用 () 控制花期的主要途径有春化作用和休眠期调节等。A
A、温度调节 B、光照调节 C、养分调节 D、栽培措施调节

- 16、在苗木生长季节可进行根外追肥,肥料浓度一般在 0.3%~0.5%,最大不超过 (),每 10~15 天喷一次。B
A、0.5% B、1% C、1.5% D、2%
- 17、下列土壤中的细菌属于有害细菌的是 ()。B
A、腐生菌 B、反硝化细菌 C、固氮菌 D、磷细菌
- 18、根据花卉对水分要求的不同应区别对待,湿生花卉如龟背竹、()、等应多浇水,掌握宁湿勿干的浇水原则。B
A、多浆植物 B、马蹄莲 C、仙客来 D、一串红
- 19、花卉植物在根系被修剪而伤口尚未愈合时或花芽分化阶段常采用少浇水、不浇水,称为()。C
A、喷水 B、找水 C、扣水 D、放水
- 20、对盆栽花卉个别缺水的植株单株补充浇水,称为()。B
A、喷水 B、找水 C、扣水 D、放水
- 21、多数植物进行春化处理所需的低温条件一般为 ()。C
A、-5℃~0℃ B、0℃~5℃ C、0℃~10℃ D、5℃~15℃
- 22、根据温室的使用功能,可分为()、试验教育性温室和允许观赏的商业性温室。C
A、玻璃温室 B、塑料温室 C、生产性温室 D、人工气候室
- 23、热带植物越冬一般要求温室温度不低于 16~18℃,亚热带植物不低于(),温带植物不低于 3~5℃。B
A、6~8℃ B、8~10℃ C、10~12℃ D、12~14℃
- 24、危害园林植物的蓟马,其口器属 ()。B
A、刺吸式 B、锉吸式 C、咀嚼式 D、以上均不对
- 25、用基质栽培过程中,当测得的电导度(EC)值过大时,常用水淋洗基质,排出过多盐分,清洗后排出水的电导度值必须小于()毫欧姆/厘米。B
A、1.5 B、2 C、2.5 D、3
- 26、无土栽培灌溉液最适 PH 值为()。B
A、5.5~6 B、6~6.5 C、6.5~7 D、7~7.5
- 27、冬季在日光温室()唐菖蒲,而温室缺乏加温条件,当地光照过弱,则往往出现“盲花”,花枝产量降低。B
A、抑制栽培 B、促成栽培 C、正常栽培 D、温室栽培
- 28、我国菊花在 ()于园中栽培更加广泛,除黄色菊花外,还出现了紫色和白色菊花。B
A、晋代 B、唐代 C、明代 D、清代
- 29、行标《园林绿化工程施工及验收规范》适用于 () 的施工及质量验收。D
A、各类市政工程 B、各类住宅工程
C、各类住宅园林绿化工程 D、各类绿地园林绿化工程
- 30、()属于酸性肥料。B
A、尿素 B、硫酸铵 C、硝酸铵 D、磷酸二氢钾
- 31、()吸湿性强,易溶于水,但易燃烧和爆炸,严禁与有机肥混合放置。B
A、尿素 B、硝酸铵 C、过磷酸钙 D、硫酸铵
- 32、一般用()的磷酸二氢钾溶液作根外追肥,在花蕾形成前喷施,可促进开花。
D
A、0.4% B、0.3% C、0.2% D、0.1%

- 33、苗期施全素肥料，花果期以施()为主，观叶花卉以氮肥为主。B
A、氮肥 B、磷肥 C、钾肥 D、复合肥
- 34、菊花缺()时，幼叶淡绿，并逐渐向植株基部扩展，严重时叶子几乎全部变成白色。B
A、镁 B、铁 C、锰 D、硼
- 35、种子休眠指种子本身未完全通过()或存在发芽的障碍，给予适当的发芽条件而仍不能萌发的现象。A
A、生理成熟 B、形态成熟 C、春化作用 D、完全成熟
- 36、蚜虫的天敌是()。C
A、蚱壳虫 B、天牛 C、瓢虫 D、蓟马
- 37、防治蚱壳虫关键是冬季用()喷杀越冬雌虫。B
A、40%氧化乐果 B、石硫合剂 C、25%亚砷酸磷 D、80%敌敌畏
- 38、()主要危害花卉植物的茎干、枝，危害期为全年。D
A、卷叶螟 B、蚜虫 C、红蜘蛛 D、天牛
- 39、与铵态氮相比，硝态氮肥更多的促进种苗()的生长，利于形成良好的根冠比。A
A、根系 B、叶片 C、茎干 D、地上部
- 40、()危害花卉植物的根部，危害期4至10月。B
A、立枯病 B、白绢病 C、炭疽病 D、白粉病
- 41、()可防治各种植物真菌病害，也可兼治叶螨类，不能与强碱性药剂混用。A
A、代森锌 B、代森铵 C、代森锰锌 D、百菌清
- 42、()可防治各种真菌病害，对细菌性病害也有较好防效，但不能和石硫合剂、波尔多液混用。A
A、百菌清 B、代森锌 C、代森锰锌 D、代森铵
- 43、()喷雾、涂干浇灌均可防治各类害虫，土施防治线虫，属氨基甲酸酯类农药。B
A、速灭威 B、灭多威 C、抗蚜威 D、甲萘威
- 44、()属于细菌性杀虫剂，对鳞翅目害虫有良好的防治效果。C
A、杀灭菊酯 B、百菌清 C、苏云金杆菌粉剂 D、速灭威
- 45、()属于植物性杀虫剂，是生态环保类农药。B
A、BT乳剂 B、烟参碱 C、百菌清 D、杀灭菊酯
- 46、()主要生产郁金香、风信子、百合、唐菖蒲等球根花卉。B
A、哥伦比亚 B、荷兰 C、以色列 D、泰国
- 47、中国花卉种类资源丰富，原产的乔灌木树种共约()余种，在国际上名列前茅。A
A、8000 B、7000 C、9000 D、6000
- 48、原产热带、亚热带的不耐寒花卉当气温下降到()℃，就会被迫休眠及至死亡。B
A、-5~0 B、0~10 C、0~5 D、10~15
- 49、长日照植物指在营养生长转入开花时期，需要一定时期、一定长度的日照才能开花的植物，通常每天光照时间超过()小时以上。B
A、13 B、12 C、11 D、14
- 50、空气中适量的二氧化碳能增加花卉植物光合效率，但是二氧化碳含量增加到

- ()以上反而会抑制光合作用,对花卉生长有害。B
A、1%~4% B、2%~5% C、3%~6% D、4%~7%
- 51、()的主要任务是扩大良种数量,保持并提高良种性状;恢复已退化的优良品种;保持并不断提高良种的生活力。C
A、组织培养 B、工厂化育苗 C、良种繁育 D、杂交育种
- 52、()在冬季自然开花。D
A、牡丹 B、桂花 C、菊花 D、梅花
- 53、()是我国十大传统名花之一。A
A、兰花 B、茉莉花 C、三角梅 D、栀子花
- 54、促进扦插生根的生长调节物质主要为生长素类如()。A
A、吲哚乙酸、萘乙酸 B、吲哚乙酸、矮壮素
C、萘乙酸、矮壮素 D、多效唑、吲哚乙酸
- 55、()不是水生花卉植物。C
A、荷花 B、睡莲 C、水杉 D、王莲
- 56、()属于木本花卉植物。C
A、金鱼草 B、瓜叶菊 C、扶桑 D、向日葵
- 57、()属于草本花卉植物。D
A、木槿 B、木芙蓉 C、龙船花 D、向日葵
- 58、()是一年生草本花卉。B
A、柳叶马鞭草 B、硫华菊 C、蜀葵 D、菊花
- 59、()是宿根多年生花卉。B
A、蜀葵 B、菊花 C、一串红 D、百日草
- 60、请选出需要在温室栽培的花卉品种()。C
A、石竹 B、三色堇 C、花烛 D、长春花
- 61、请选出在福州地区1~3月开花的藤本花卉植物()。D
A、使君子 B、紫藤 C、大花老鸦嘴 D、炮仗花
- 62、()是长日照花卉植物。B
A、菊花 B、鸡冠花 C、一串红 D、蟹爪兰
- 63、()是短日照花卉植物。B
A、杜鹃花 B、菊花 C、夏堇 D、萱草
- 64、()是夏季开花的木本花卉植物。C
A、紫玉兰 B、碧桃 C、紫薇 D、山茶花
- 65、()是春季开花的木本花卉植物。C
A、紫薇 B、木槿 C、碧桃 D、蜡梅
- 66、()属阳性花卉植物。A
A、波斯菊 B、栀子 C、常春藤 D、肾蕨
- 67、()是多年生宿根草本花卉。C
A、旱金莲 B、孔雀草 C、千屈菜 D、月季
- 68、夏季开花的球根花卉是()。A
A、美人蕉 B、郁金香 C、百合 D、仙客来
- 69、请选出不属于仙人掌及多浆植物的花卉品种()。C
A、令箭荷花 B、蟹爪兰 C、马蹄莲 D、八宝景天
- 70、用于嫁接大花月季的砧木是()。A
A、蔷薇 B、月季 C、玫瑰 D、山木香

- 71、()是落叶藤本花卉植物。B
A、炮仗花 B、紫藤 C、金银花 D、锦屏藤
- 72、()是较耐寒草本花卉。C
A、紫茉莉 B、长春花 C、羽衣甘蓝 D、彩叶草
- 73、用于嫁接杜鹃花的砧木是()。A
A、毛杜鹃 B、夏杜鹃 C、东杜鹃 D、高山杜鹃
- 74、列举一种春季开花的落叶乔木()。A
A、刺桐 B、波斯皂荚 C、白兰花 D、蓝花楹
- 75、请选出一种夏季开花的常绿乔木()。D
A、木棉 B、羊蹄甲 C、鱼木 D、澳洲火焰木
- 76、请选出一种秋季开花的落叶乔木()。B
A、丹桂 B、栾树 C、海南蒲桃 D、夹竹桃
- 77、请选出一种秋季开花的石蒜科球根植物()。B
A、百合 B、彼岸花 C、萱草 D、樱花
- 78、请选出一种冬季开花的常绿灌木()。C
A、白千层 B、腊梅 C、山茶花 D、樱花
- 79、()繁殖的缺点是手续较繁杂、技术要求较高、寿命较实生苗短。D
A、扦插 B、播种 C、孢子 D、嫁接
- 80、嫁接菊花常选用()作为砧木。D
A、菊花 B、麦秆菊 C、翠菊 D、青蒿
- 81、请选出一种先开花后长叶的乔木()。C
A、凤凰木 B、白兰花 C、木棉 D、栾树
- 82、请选出一种先长叶后开花的小乔木()。D
A、紫玉兰 B、碧桃 C、福建山樱花 D、石榴
- 83、紫玉兰、碧桃、福建山樱花一般在哪个季节开花()。A
A、春 B、夏 C、秋 D、冬
- 84、请选出属于木犀科茉莉属的花卉植物()。A
A、茉莉花 B、非洲茉莉 C、鸳鸯茉莉 D、'希茉莉
- 85、请选出不属于菊科的花卉植物()。C
A、金盏菊 B、波斯菊 C、千日红 D、百日草
- 86、既可观花又可观果的落叶灌木是()。C
A、火棘 B、南天竹 C、石榴 D、含笑
- 87、全光雾插的原理是使插条总是处在适宜的温湿度条件下，保持插条的()。
同时使插条继续()合成营养物质，从而促进插条生根。B
A、水分平衡，呼吸作用 B、水分平衡，光合作用
C、养分平衡，光合作用 D、养分平衡，呼吸作用
- 88、请选出一种多年生常绿开花草本植物()。C
A、柳叶马鞭草 B、马蹄莲 C、鹤望兰 D、铁线蕨
- 89、以下属于同种色叶类开花植物的是()。A
A、红叶小檗、红龙草、红花檵木、紫叶酢浆草
B、红背桂、紫背竹芋、红叶李、红桑
C、栾树、无患子、鸡爪槭、枫香
D、红枫、红叶乌桕、红景天、乌桕
- 90、()是乔灌木类开花芳香植物。A

- A、含笑 B、金银花 C、水仙 D、紫罗兰
- 91、()是藤本类开花芳香植物。D
A、丁香 B、白兰 C、薄荷 D、木香
- 92、()是草本类开花芳香植物。A
A、薰衣草 B、多花蔷薇 C、厚皮香 D、九里香
- 93、下列哪种不是湿生植物()。A
A、睡莲 B、旱伞草 C、千屈菜 D、海芋
- 94、()成为世界上多种秋植球根花卉的分布中心。B
A、中国气候区 B、地中海气候区 C、欧洲气候区 D、热带气候区
- 95、()是百日草、万寿菊、大丽花、杜鹃花和部分春植球根花卉的分布中心。
B
A、欧洲气候区 B、热带高原气候区
C、沙漠气候区 D、大陆东岸气候区
- 96、()是不耐寒一年生花卉及热带花木类植物分布中心。C
A、热带高原气候区 B、沙漠气候区 C、热带气候区 D、欧洲气候区
- 97、影响植物扦插成活的环境条件不包括 ()。D
A、温度 B、湿度 C、光照 D、植物遗传特性
- 98、以下关于菊花说法不正确的是 ()。A
A、菊花是菊科菊属的单性花
B、菊花舌状花颜色丰富，管状花多为黄色
C、菊花受蚜虫危害比较严重，从苗期到花期均有发生
D、摘心会推迟花期
- 99、()一般适用于蟹爪兰等扁平茎节的悬垂性种类。C
A、切接法 B、平接法 C、插接法 D、劈接法
- 100、通常采用分球法繁殖的花卉植物是()。A
A、郁金香 B、虎耳草 C、卷丹 D、兰花
- 101、以下哪个不是社会主义核心价值观的内容 ()。D
A、富强、民主、文明、和谐 B、自由、平等、公正、法治
C、爱国、敬业、诚信、友善 D、爱岗、忠诚、信用、团结
- 102、植物发育的某一阶段，感受 () 环境，促进开花的现象叫做春化作用。
D
A、弱光 B、高温 C、强光 D、低温
- 103、人类应用最早的育种方法是 ()。B
A、杂交育种 B、选择育种 C、引种驯化 D、辐射育种
- 104、将 () 的多种植物组合种植在同一容器内、使其具有装饰作用，这种手法就是花卉组合盆栽。 B
A、高矮相同、大小不同、色彩相近、习性不同
B、高矮不一、大小不同、色彩多样、习性相近
C、高矮不一、大小相同、色彩多样、习性相近
D、高矮不一、大小不同、色彩相近、习性不同
- 105、植物之所以能够从土壤中吸收水分和无机盐，主要是由于 () 活动的结果。C
A、根冠 B、伸长区 C、根毛区 D、分生区
- 106、中国传统大菊的舌状花形态划分为五大类，下面哪一种 () 不属于这五

大类瓣型。C

A、平瓣类 B、匙瓣类 C、筒瓣类 D、桂瓣类

107、在进行嫁接繁殖时，为保证成活率，操作时务必使砧木和接穗 ()。C

A、木质部对齐 B、韧皮部对齐 C、形成层对齐 D、髓部对齐

108、锈病是一种常见的菊花病害，其特点不包括 ()。B

A、叶片黄褐色斑点 B、花蕾白色绒样病斑

C、叶背疱状突起 D、有黄色粉末散出

109、为适应环境变化，温室花卉春季出房前一般采取逐渐增加光照强度和通风量，() 等措施进行锻炼。A

A、降低温度、控制水肥 B、降低温度、增加水肥

C、升高温度、控制水肥 D、升高温度、增加水肥

110、() 的生理意义是能够产生蒸腾拉力，降低植物体的温度，促进无机盐在植物体内的运输。D

A、春化作用 B、光合作用 C、呼吸作用 D、蒸腾作用

111、有关植物光合作用和呼吸作用正确的说法是 ()。C

A、所有植物通过光合作用贮存自身生活需要的化学能和有机物质

B、绿色叶片是植物吸收光的唯一器官

C、一般情况下植物呼吸作用最适温度比光合作用高

D、一般情况下植物呼吸作用最适温度比光合作用低

112、菊花从品系上分，花径在 6-10 厘米的一般称为 ()。C

A、大菊类 B、小菊类

C、中菊类 D、菊花

113、土壤孔隙度是指 () 的百分数。A

A、土壤孔隙占土壤总体积 B、土壤空隙占土壤总重量

C、土壤重量占土壤总体积 D、土壤重占土壤总重量

114、标本菊多为典型的短日照植物，每天要有不长于() 小时左右的日照条件才能开花。C

A、5 B、7 C、10 D、14

115、菊花栽培过程中，常产生封顶现象。原因是()。D

A、品种遗传特性 B、缺乏低夜温和短日照条件

C、选芽不当 D、以上都是

116、保护和释放草蛉防治蚜虫的方法属于 ()。D

A、物理防治 B、化学防治 C、综合防治 D、生物防治

117、菊花的叶片形态各异，可以作为品种鉴定的元素之一，一般以花下第 () 片叶最能体现品种特征。B

A、1~2 B、4~5 C、7~8 D、10~11

118、() 通常是在选育菊花新品种时使用的繁殖方式。D

A、扦插繁殖 B、嫁接繁殖 C、分株繁殖 D、播种繁殖

119、在养护标本菊的过程中，为保证脚叶不脱落，以下措施不正确的是 ()。A

A、加大磷钾肥的供应 B、及时添加盆土

C、预防病虫害 D、后期盆土供水要及时

120、在夜长大于一定时数环境下才能开花的植物称为短日照植物，如 () 等。B

- A、菊花、中国凤仙、唐菖蒲 B、菊花、一品红、蟹爪兰
C、一品红、波斯菊、月见草 D、天竺葵、一品红、鸢尾
- 121、下列关于功能性菊花说法不正确的是 ()。D
A、功能性菊花包括食用菊花、茶用菊花和药用菊花。
B、茶用菊花根据其采收时期不同分为胎菊和普通茶菊。
C、杭白菊主要做茶用菊花、杭黄菊主要做药用菊花。
D、茶菊和药菊品质好坏的主要衡量指标是黄酮类化合物的含量高低。
- 122、按气候类型划分,菊花属于 ()。A
A、大陆东岸气候型 B、大陆西岸气候型
C、地中海气候型 D、以上说法均不正确
- 123、中国当代菊花品种分类系统将大菊品种依据花瓣形态分为 () 类。B
A、四 B、五 C、六 D、七
- 124、下列属于常用的温室植保设备有: ()。C
A、防虫网、药物喷施设备、药物熏蒸设备、风机
B、昆虫诱捕设备、防虫风扇、隔离消毒池、水帘
C、防虫网、药物喷施设备、药物熏蒸设备、昆虫诱捕设备
D、防虫风扇、隔离消毒池、水帘、药物熏蒸设备
- 125、鸡冠花、() 为苋科一、二年生花卉。D
A、五色苋、彩叶草、百日草 B、千日红、雁来红、一品红
C、雁来红、千日红、麦杆菊 D、五色苋、千日红、雁来红
- 126、在菊花常用的肥料中,下面哪种不是有机肥 ()。C
A、人粪尿 B、麻饼 C、氮磷钾复合肥 D、骨粉
- 127、下列不属于花期控制的理论学说的是 ()。D
A、光周期学说 B、春化作用学说
C、碳氮比学说 D、年周期学说
- 128、独本菊的开花时间多集中于十一月前后,为了满足国庆市场需求,我们可以通过对部分品种 进行 () 使其提前开花。A
A、长日照季节遮光处理 B、花期增施氮肥
C、短日照季节补光处理 D、打顶摘心
- 129、菊花生长对基质要求严格,栽培菊花的基质特点包括下列 ()。DA、土质松软 B、半沙型 C、富含腐殖质 D、以上都是
- 130、菊花白粉病多发于 8-10 月, ()不是导致白粉病加重的原因。AA、摆放间距大 B、空气湿度大
C、通风不良 D、光照不足
- 131、蚜虫是危害菊花的主要害虫之一,它属于 ()。C
A、咀嚼式口器害虫 B、蛀干害虫
C、刺吸式口器害虫 D、地下害虫
- 132、植物组织培养的理论基础是 ()。C
A、皮部生根原理 B、髓部生根原理
C、植物细胞的全能性 D、以上均不对
- 133、适宜菊花生长的 pH 值范围约为 ()。B
A、5.5~6.5 B、6.5~7.5 C、7.5~8.5 D、以上均不对
- 134、小菊的瓣型以 () 为主。A
A、平瓣 B、匙瓣 C、管瓣 D、畸瓣

135、农历 9 月前后，菊花进入生长旺季，此时采用的浇水法称为“放水”，即（ ）。B

A、见湿见干 B、见湿不见干 C、见干不见湿 D、以上均不是

136、原本悬崖菊栽培期稍长，通常采用（ ）的繁殖方式。C

A、春插 B、夏插 C、秋插 D、冬插

137、生产优质盆花的关键环节主要包括：选用优质种苗、（ ）、实施严格的病虫害防治、花期控制和一致性控制。D

A、环境控制 B、栽培管理 C、依据品种区别对待 D、针对品种习性特点进行环境控制和栽培管理

138、现代化生产中组织培养的主要优势是（ ）。D

A、可用于品种改良 B、可用于体细胞杂交

C、可用于人工种子制造 D、繁殖系数高、可满足集约化生产的需要

139、菊花生长的适宜温度为（ ）。C

A、10~15℃ B、15~20℃ C、15~25℃ D、20~25℃

140、以下（ ）不属于菊花花腐病的主要特征。C

A、该病主要侵染花芽和花瓣，也可侵染叶、叶柄和茎部组织。

B、花芽受害后呈深褐色腐烂，腐烂斑沿花梗扩展，花芽掉落，花序受害呈半边畸形，花心变黑，枯死。

C、发病初期，在叶片的上下表面出现浅黄色的斑点，后来在叶背出现黄褐色至深褐色的疮疤状突起，随着突起的破裂，散出黄褐色的粉状物。

D、如果病害沿花梗扩展，则花梗变黑软化，花冠下垂。叶片受害后呈不规则的黑色病斑，并可沿叶柄蔓延至茎部。

141、对于成龄植株适当增施（ ），可以促进植株从营养生长向生殖生长转化。D

A、氮肥 B、磷肥 C、铁肥 D、磷、钾肥

142、我国菊花大约自 10 世纪起经朝鲜传到日本，（ ）经荷兰商人传到欧洲，（ ）传到美国。C

A、15 世纪、17 世纪 B、16 世纪、17 世纪

C、17 世纪、19 世纪 D、17 世纪、18 世纪

143、下列氮肥能被花卉直接吸收的是（ ）。B

A、氨水 B、硝酸铵 C、尿素 D、以上均不能

144、菊花栽培过程中采取的一系列技术措施统称为管理。包括（ ）等。D

A、育苗、摘心 B、整型、裱扎、拔蕾

C、浇水、施肥 D、以上都是

145、标本菊栽培多做（ ）。A

A、春插 B、夏插 C、伏插 D、秋插

146、为了保持品种的优良特性，在生产中，菊花的繁殖方式主要是（ ）。B

A、压条 B、扦插 C、嫁接 D、播种

147、扦插繁殖是许多宿根花卉的主要繁殖方法之一，其中茎插成活的关键是（ ）。C

A、芽的发生 B、叶的发生 C、根的发生 D、块茎的发生

148、一朵完全花包括（ ）。A

A、花萼、花冠、雌蕊、雄蕊 B、花被、花轴、雌蕊、雄蕊

C、花托、花冠、雌蕊、雄蕊 D、花托、花萼、雌蕊、雄蕊

149、温室的 () 主要措施有调节覆盖材料的透光率、使用不同透光率的遮荫网和进行人工补光等。B

A、环境调节 B 光照调节 C、温度调节 D、气体调节

150、以下能够忍受最低温度 0℃ 以下的花卉种类是 ()。D

A、倒挂金钟和金鱼草 B、仙客来和金盏菊

C、蜀葵和金鱼草 D、蜀葵和射干

151、菊花常见的虫害有 ()。ABD

A、红蜘蛛 B、蚜虫 C、切叶蜂 D、潜叶蝇

152、下面哪种不是常见的艺菊技法之一 ()。C

A、悬崖菊 B、大立菊 C、嵯峨菊 D、盆景菊

153、以下关于菊花说法不正确的是 ()。A

A、菊花是菊科菊属的单性花。

B、菊花舌状花颜色丰富，管状花多为黄色

C、菊花受蚜虫危害比较严重，从苗期到花期均有发生。

D、摘心会推迟花期。

154、以下方法中，() 繁殖的缺点是程序较繁杂、技术要求较高，其寿命较实生苗短。D

A、扦插 B、播种 C、孢子 D、嫁接

155、基质水分过多使植物受害的主要原因不包括 ()。D

A、土壤缺氧，抑制根系有氧呼吸 B、根系无氧呼吸产生有害物质

C、土壤酸性增加 D、土壤养分不足致使植株养分缺乏

156、摘心可增加分枝数，使枝条充实，促进花芽分化，生产中常采用摘心处理的花卉有 ()。B

A、金鸡菊、一串红 B、小菊、一串红

C、黑心菊、小菊 D、天人菊、金鸡菊

(二) 多项选择题

- 1、花卉用途广，经济价值高，有以下用途()。ABCD
A、药用 B、食用 C、饮用 D、香料
- 2、花香可以治病，例如()的香味有镇定神经作用，()的香味有助于治疗头痛，()的香味有助于治疗咽喉痛。ABD
A、天竺葵 B、菊花 C、茉莉花 D、栀子花
- 3、我国十大传统名花为()、牡丹、菊花、()、月季花、杜鹃花、()、荷花、桂花、水仙花。ABC
A、梅花 B、兰花 C、山茶花 D、茉莉花
- 4、花卉露地应用中属于不规则式种植的是()。BCD
A、花坛 B、花带 C、花境 D、花丛
- 5、国际花卉市场，花卉产品分为()类型。ABD
A、鲜切花 B、盆花 C、球根 D、干花
- 6、荷兰主要生产()、唐菖蒲等球根花卉。ABD
A、郁金香 B、风信子 C、朱顶红 D、百合
- 7、嫁接培育什锦菊时，可选择()作为砧木。ABC
A、白蒿 B、黄蒿 C、青蒿 D、以上均不对
- 8、植物能够进行无性繁殖的生物学原理是()。AB
A、植物细胞的全能性 B、植物营养器官具有再生性
C、植物能进行光合作用制造有机物 D、植物也进行呼吸作用
- 9、花卉的生长发育除受遗传特性影响外，是在各种外界环境因子综合作用下完成的，这些因子包括()空气和生物等要素。ABC
A、温度 B、光照 C、水分 D、土壤
- 10、温度的三基点包括()。ABC
A、最低点温度 B、最适点温度
C、最高点温度 D、以上均不是
- 11、依花卉对光照强度的要求，可大致将它们分为()类型。ABD
A、阳性花卉 B、阴性花卉 C、露地花卉 D、中性花卉
- 12、依据植物开花对日照长短的要求不同，可将花卉分为()类型。ABC
A、长日照植物 B、短日照植物 C、中日照植物 D、温室植物
- 13、花卉的生长、开花、结果需要 16 种营养元素的供应，即碳、氢、氧、氮、磷、钾、硫、钙、镁、()、锰、钼和氯。ABCD
A、铁 B、硼 C、锌 D、铜
- 14、对二氧化硫污染抗性强的花木有鸡冠花、菊花、()、山茶、枸骨等花木。ABCD
A、石竹 B、夹竹桃 C、冬青 D、海桐
- 15、对氯气抗性强的花木有矮牵牛、一串红、唐菖蒲、()、大叶黄杨、海桐等。ABCD
A、大丽花 B、朱蕉 C、扶桑 D、夹竹桃
- 16、无性繁殖又称营养繁殖，是一种快速、简便又能保持品种特性的繁殖方法，通常包括()等方法。ABCD
A、分生 B、扦插 C、嫁接 D、压条
- 17、根据所用植物扦插繁殖的营养器官不同，可分为()等方法。ABCD
A、枝插 B、叶插 C、叶芽插 D、根插

- 18、能促进插条生根的植物生长激素很多,其中效果最好的是()等。ABC
A、吲哚丁酸 B、萘乙酸 C、吲哚乙酸 D、赤霉素
- 19、温室常用的扦插基质有河沙、腐叶土、()水等。ABCD
A、泥炭 B、蛭石 C、珍珠岩 D、炉渣
- 20、花卉中常用的嫁接法可分为()。ABC
A、枝接 B、芽接 C、根接 D、切接
- 21、嫁接苗的管理包括()。ABC
A、检查成活率 B、解除绑缚 C、剪砧 D、遮阴
- 22、盆栽花卉的栽培措施有()。ABCD
A、上盆和换盆 B、浇水 C、施肥 D、整形修剪
- 23、培养土是由()、山泥、砻糠灰及河沙、砖碎、煤渣等按一定比例配合而成。ABCD
A、腐叶土 B、厩肥土 C、垃圾土 D、园土
- 24、露地花卉的栽培管理措施有()、灌溉浇水、施肥、中耕除草。ABCD
A、整地作畦 B、播种繁殖 C、间苗 D、移植
- 25、花卉培养土的配置原则是:()。ABD
A、养分要全面 B、良好的理化性状 C、消毒 D、配比适当
- 26、培养土消毒是防治花卉病虫害的重要措施,目前常用且成本较低的方法有()。AC
A、药剂消毒 B、蒸汽消毒 C、曝晒 D、烘干
- 27、花穗长而大或自然分枝力强的花卉种类不宜摘心,如()、向日葵、CO 麦秆菊等。CD
A、菊花 B、大丽花 C、鸡冠花 D、蜀葵
- 28、温室依不同的屋架材料、采光材料等可分为:()。ABCD
A、塑料温室 B、玻璃温室 C、日光温室 D、塑料大棚
- 29、现温室管理的常用手段是借助人工调控温室的()等。ABCD
A、温度 B、湿度 C、光照 D、通风
- 30、温室管理中常用调节光照的方法有:()。AB
A、覆盖苇帘 B、遮光网 C、喷雾 D、通风
- 31、有些既怕夏季暑热,又怕雨淋,要求通风良好的花卉,应专门搭设防雨阴棚来养护,如()、倒挂金钟、金边瑞。AC
A、君子兰 B、三角梅 C、仙客来 D、变叶木
- 32、无土栽培技术的优点()。ABCD
A、清洁卫生 B、病虫害少 C、节省劳力 D、节约土地
- 33、根据基质种类分类,无土栽培有()方法。BC
A、水培法 B、有机基质培 C、无机基质培 D、岩棉培
- 34、根据栽培设施分类,无土栽培有()。ABC
A、单一式 B、简易式 C、综合式 D、槽式
- 35、无土栽培在栽培所有阶段,每隔 2~3 周要监测灌溉液的(),控制灌溉及施肥时营养液的浓度。ABCD
A、酸碱度 B、电解质 C、氮盐 D、氯离子
- 36、无土栽培营养液 PH 值影响各种离子的吸收,当 PH 值为 8 时,易缺乏()元素。ABC
A、Fe B、Mg C、P D、K

- 37、无土栽培营养液 PH 值降至 4.5 时, ()离子沉淀多。BCD
A、P B、Ca C、Mg D、K
- 38、花期控制有以下的意义()ABCD
A、集中开花办花展 B、解决市场淡旺矛盾
C、有利于育种工作 D、缩短栽培期
- 39、休眠依其深度和阶段不同, 可分为()类型。AC
A、自发休眠 B、高温休眠 C、强迫休眠 D、低温休眠
- 40、实现()的途径主要是控制温度、光照等生长发育的气候因子。CD
A、温室栽培 B、露地栽培 C、促成栽培 D、抑制栽培
- 41、温度与光照对花期控制既有质的作用, 也有量的作用, 在接受特殊温度或光周期条件下使植株加速通过()等过程, 而达到促进开花。ABC
A、成花诱导 B、花芽分化 C、休眠 D、抽梢
- 43、菊花周年供花需要调节(), 采用长日照抑制成花促进营养生长, 利用短日照诱导孕育花芽和花芽分化等多项措施。BC
A、播种时期 B、扦插时期 C、摘心时期 D、摘蕾时期
- 44、()属鳞茎类的球根花卉植物。ABC
A、郁金香 B、百合 C、水仙 D、唐菖蒲
- 45、长日照处理的方法有多种, 目前生产上应用较多的是()。CD
A、间隙照明法 B、交互照明法 C、延长照明法 D、暗中断法
- 46、采用修剪、摘心、除芽等外科措施, ()、倒挂金钟、一串红等多种花卉, 在适宜条件下一年可多次开花。ABD
A、月季 B、茉莉 C、波斯菊 D、香石竹
- 47、以下()是有机肥料。ABCD
A、人粪尿 B、家禽粪 C、饼肥 D、堆肥
- 48、以下()不是碱性肥料。ABD
A、堆肥 B、饼肥 C、草木灰 D、家禽粪
- 49、以下()是氮肥。ABC
A、尿素 B、硫酸铵 C、硝酸铵 D、磷酸钾
- 50、以下()属酸性肥料。BC
A、尿素 B、硫酸铵 C、硝酸铵 D、磷酸二氢钾
- 51、以下()是磷肥。ABC
A、过磷酸钙 B、磷酸二氢钾 C、磷酸钾 D、尿素
- 52、以下()是钾肥。ABCD
A、硫酸钾 B、氯化钾 C、硝酸钾 D、草木灰
- 53、()是磷钾复合肥料, 易溶于水, 速效, 可做根外追肥。AB
A、磷酸钾 B、磷酸二氢钾 C、硝酸钾 D、硫酸钾
- 54、微量元素对花卉生长起着不可替代的作用, 常用微量元素有()等。ABCD
A、铁 B、镁 C、锰 D、硼
- 55、蚜虫几乎危害所有的花卉植物, 其危害部位主要在()。ABC
A、嫩芽 B、叶片 C、花 D、枝干
- 56、培育标本菊时, 为防止脚叶脱落, 可以采取的措施是()。BD
A、扎缚植株 B、及时浇水 C、增施氮肥 D、及时添加盆土
- 57、5~6 月用()或()喷杀防治红蜘蛛, 防效较好。BC
A、25%乐果乳剂 1500 倍液 B、40%氧化乐果 800 倍液

C、20%三氯杀螨醇乳剂 1000 倍液 D、80%敌敌畏乳剂 1500 倍液

58、()主要危害花卉植物的叶与花。CD

A、卷叶螟 B、蚧壳虫 C、蓟马 D、蚜虫

59、危害花卉植物的虫类有：()。ABC

A、蚜虫 B、红蜘蛛 C、蚧壳虫 D、瓢虫

60、()属球茎类的球根花卉植物。BCD

A、百合 B、朱顶红 C、唐菖蒲 D、香雪兰

61、立枯病的防治措施：()。ABC

A、播种前进行土壤消毒 B、及时拔出来和处理病株

C、发病初期用托布津 1000 倍浇灌 D、用敌百虫 800 倍喷杀

62、白绢病的防治措施：()。ABCD

A、拔出病株

B、切忌使用带菌土壤

C、在病株根周围浇灌 50%托布津 500 倍溶液

D、在病株根茎周围施草木灰

63、以下()是非内吸性杀菌剂。ABC

A、代森锌 B、百菌清 C、代森锰锌 D、代森铵

64、以下()是内吸性杀菌剂。ACD

A、乙磷铝 B、多菌灵 C、甲基托布津 D、甲霜灵

65、以下()属于有机磷酸酯类杀虫剂农药。ABCD

A、敌百虫 B、敌敌畏 C、氧化乐果 D、辛硫磷

66、以下()属于拟除虫菊酯类农药。ABCD

A、杀灭菊酯 B、敌杀死 C、灭扫利 D、虫螨灵

67、依花卉对光照强度的要求，可大致将它们分成以下()类。ABC

A、阳性花卉 B、阴性花卉 C、中性花卉 D、旱生花卉

68、通常观赏小菊类可以在哪些花卉布置形式中应用()。ABCD

A、平面花坛 B、立体花坛 C、花境 D、花带

69、以下()属于阴性花卉。ABCD

A、蕨类植物 B、鸭趾草科植物 C、天南星科植物 D、秋海棠类

70、对于花卉的病虫害防治措施，属于生物防治的是()。CD

A、生长过程中定期喷洒药剂预防病虫害的发生

B、喷洒杀虫剂时混合杀菌剂进行防治

C、施药时选择生物制剂

D、利用释放草蛉、蚜茧蜂等天敌防治蚜虫

71、请选出多种湿生花卉植物()。ACD

A、海芋 B、荷花 C、莎草 D、香蒲

72、请选出在冬季能自然开花的植物()。ABC

A、腊梅 B、梅花 C、蟹爪兰 D、牡丹

73 属于兰科的植物是()。AB

A、石斛兰 B、蝴蝶兰 C、虎尾兰 D、君子兰

74、兰花按生态习性主要分为()类。ABCD

A、地生兰 B、气生兰 C、腐生兰 D、热带兰

75、以下()属白色系开花植物。ABCD

A、茉莉花 B、广玉兰 C、白兰花 D、栀子花

- 76、以下()是木本花卉植物。ABC
A、扶桑 B、木芙蓉 C、夹竹桃 D、柳叶马鞭草
- 77、以下()是一年生草本花卉植物。ABCD
A、向日葵 B、一串红 C、硫华菊 D、百日草
- 78、无土栽培的优点包括()。ABC
A、作物产量高、品质好 B、节约肥水
C、植物病虫害少，产品清洁卫生 D、劳力增加
- 79、()根茎类的球根花卉植物。BC
A、美人蕉 B、荷花 C、睡莲 D、马蹄莲
- 80、()是禾本科多年生草本观赏植物。ACD
A、火焰狼尾草 B、细叶兰 C、花叶芦竹 D、粉黛乱子草
- 81、()属长日照草本花卉植物。ABC
A、鸡冠花 B、油菜花 C、凤仙花 D、菊花
- 82、()属短日照草本花卉植物。ABC
A、菊花 B、一串红 C、一品红 D、鸡冠花
- 83、()是夏季开花的落叶木本植物。AB
A、紫薇 B、石榴 C、扶桑 D、双荚槐
- 84、()属块茎类的球根花卉植物。ACD
A、马蹄莲 B、仙客来 C、晚香玉 D、美人蕉
- 85、在气候适宜、养护管理得当的条件下，一年四季都能开花的花卉植物有：()。
ABC
A、四季桂 B、非洲菊 C、大花月季 D、瓜叶菊
- 86、()属于阳性花卉植物。ABC
A、一串红 B、波斯菊 C、夏堇 D、大叶栀子
- 87、()属于阴性花卉植物。ABC
A、肾蕨 B、兰花 C、龟背竹 D、月见草
- 88、较耐寒的一二年生草本花卉有：()。ABC
A、冰岛虞美人 B、三色堇 C、羽衣甘蓝 D、马缨丹
- 89、秋季播种春季开花的球根花卉有()。BC
A、葱兰 B、郁金香 C、花毛茛 D、玉簪
- 90、能在同一砧木上嫁接同一种多个花色的花卉品种是：()。ABCD
A、三角梅 B、杜鹃花 C、山茶花 D、菊花
- 91、光对花卉种子萌发有不同影响，有些种子曝光时发芽比在黑暗中发芽的效果好，一般称为好光性种子，如()等。ABCD
A、报春花 B、彩叶草 C、非洲凤仙 D、大岩桐
- 92、有些花卉的种子需要在黑暗条件下发芽，称为嫌光性种子，如()
等，这类种子播种后必须覆土，否则不会发芽。BC
A、半枝莲 B、仙客来 C、一串红 D、彩叶草
- 93、花卉因原产地的生态条件不同，对水分的要求有很大的差异，大体可分为
()类型。ABCD
A、水生花卉 B、湿生花卉 C、中生花卉 D、旱生花卉
- 94、水生花卉指在水中才能正常生长的一类花卉，遇干燥则枯死，如()。ABC
A、荷花 B、睡莲 C、王莲 D、水仙
- 95、湿生花卉指适于生长在水分比较充裕，甚至积有浅水条件下的一类花卉，如

- ()、燕子花、合果芋、龟背竹等。ABC
A、旱伞草 B、马蹄莲 C、海芋 D、睡莲
- 96、根据花卉对土壤酸碱度要求的不同,可将花卉分为以下()类型。ABC
A、酸性花卉 B、中性花卉 C、碱性花卉 D、阳性花卉
- 97、影响嫁接成活的因素有()。ABC
A、植物内在因素 B、环境因素 C、人为因素 D、外在因素
- 98、关于菊花扦插苗扦插后生根前的管理说法正确的是()。ABD
A、应保持较高的空气湿度 B、宜保持 20~25℃ 的温度
C、扦插后及时浇营养液 D、保持基质湿润
- 99、请选出可用分球法繁殖的花卉植物()。AB
A、百合 B、唐菖蒲 C、晚香玉 D、八仙花
- 100、赤霉素是一类植物激素,在栽培生产上有以下()用途。ABCD
A、刺激叶和芽的生长 B、打破休眠
C、促进种子萌发 D、促进抽穗
- 101、无土栽培中的无基质栽培又包括()。AB
A、水培 B、喷雾栽培 C、岩棉培 D、槽式栽培
- 102、在利用温室设施进行菊花生产时,环境调节的主要内容包括()。ABD
A、温度调节 B、光照调节 C、激素调节 D、通风
- 103、关于嫁接繁殖,说法正确的是()。ABD
A、接穗应选择健壮植株上的枝条
B、用作接穗的枝条上的芽应充实而饱满
C、砧木要选择与接穗亲缘关系远的种类
D、嫁接苗寿命一般较实生苗短。
- 104、下列栽培措施中()是培育标本菊的技法。ABCD
A、白露盆法 B、高枝压条法
C、嫁接套盆法 D、三段根系栽培法
- 105、独本菊是极具中国特色的艺菊栽培方式,培育独本菊时,从品种本身的角度来考虑,下列说法不正确的是()。CD
A、可选择大花型或有特色的中花型品种
B、应选择茎秆强壮不易倒伏的品种
C、应选择对矮化剂处理不明显的品种
D、应选择生长期较观赏期更耐粗放管理的品种
- 106、下列属于红色的中国传统菊花的品种有()。CD
A、金背大红 B、墨魁 C、卖炭翁 D、朱砂红霜
- 107、浇水按其方式不同可分为()。ABCD
A、浇水 B、找水 C、放水 D、扣水
- 108、影响菊花花芽分化的环境因素有()。AB
A、日照长短 B、温度高低
C、生长调节物质的施用 D、以上都不是
- 109、小菊露地栽培常用的布置形式有()。ABC
A、花坛 B、花境 C、花丛 D、以上均不是
- 110、以下花卉地下变态部位属于茎的是()。ABC
A、鳞茎 B、球茎 C、根茎 D、块根
- 111、以下花型为管瓣的菊花品种包括()。ABC

- A、玉翎管 B、千尺飞流 C、百鸟朝凤 D、以上都不是
- 112、以下花卉适宜在中性偏微碱的土壤中生长的是()。ABD
A、天竺葵 B、君子兰 C、非洲菊 D、仙人掌
- 113、在高温的季节进行菊花短日照处理, 为保证花芽正常分化, 说法正确的是()。ACD
A、保证植株正常的养分供给
B、减少施肥量
C、黑暗时间内温差要达到 10℃ 以上
D、短日照处理需连续进行 40~60 天
- 114、一般花卉种子耐藏性和寿命通常受()等环境因素的影响。AB
A、温度 B、光照 C、种子含水量 D、品种
- 115、我国菊花品种分类的实验生物学研究, 在()方面已取得可喜成绩。ABCD
A、数量分类学 B、细胞分类学 C、同工酶分析 D 分子标记
- 116、下列菊花常见病害中, 通常由病毒引起的病害是()。BC
A、菊花花腐病 B、菊花褪绿斑驳病
C、菊花花叶病 D、菊花锈病
- 117、在菊花生产过程中, 关于病虫害的防治, 以下说法正确的是()。ABC
A、改善栽培环境条件预防为主 B、根据不同剂型选用施药方法
C、交替轮换使用不同农药 D、使用农药是最可靠的办法
- 118、在菊花商品化生产中使用矮化剂的目的是()。ABC
A、控制株高 B、控制枝条伸长速度
C、延迟花期 D、增加侧枝节间长度
- 119、对扦插基质的要求分为()。ABC
A、无菌类污染 B、无病虫害 C、通透性好 D、保水能力强
- 120、菊花生产中常用的遮光材料不包括()。CD
A、草帘 B、遮光幕 C、塑料膜 D、聚乙烯膜
- 121、温室加温应用的方式通常有()。ABCD
A、烟道加温 B、锅炉加温 C、电器加温 D、热风加温
- 122、影响木本花卉嫁接成活的因素包括()。ABC
A、砧木和接穗间的亲和力 B、砧木和接穗的生活力
C、形成层是否对齐 D、以上答案均不正确
- 123、以下关于悬崖菊养护中摘心措施的叙述正确的是()。BC
A、前期主枝、侧枝均不摘心
B、前期主枝不摘心、侧枝摘心
C、最后一次全株摘心时应由基部分阶段逐步向尖端进行
D、最后一次全株摘心时应由尖端分阶段逐步向基部进行

(三) 判断题

- 1、袁宏道《花镜》成书于 1688 年,全书记载了栽花月历、栽培总论、栽培各论。(×)
- 2、我国十大传统名花为:梅花、牡丹、菊花、兰花、月季花、杜鹃花、山茶花、荷花、桂花、水仙花。(√)
- 3、杨维桢“万花敢向雪中出,一树独先天下春”指的是牡丹。(×)
- 4、“只道花无百日红,此花无日不春风”指的是月季花。(√)
- 5、地中海气候区成为世界上多种秋植球根花卉的分布中心。(√)
- 6、石竹、龙胆、雪莲产自寒带气候区。(×)
- 7、陈植在《观赏树木学》中,将园林树木分为:林木类、花木类、果木类、叶木类、荫木类和蔓木类。(×)
- 8、植物生育要求的温度,一般有三个基点,即最低点、最高点和最适点。(√)
- 9、扶桑、彩叶草、变叶木等要在 10~15℃才能正常越冬。(√)
- 10、半枝莲、鸡冠花、金鱼草开花必须在 25~30℃。(×)
- 11、在各种花卉中,耐热力最强的是仙人掌类植物。(×)
- 12、耐热力差的除秋植球根花卉外,还有仙客来、倒挂金钟、马蹄莲、君子兰等。(√)
- 13、一些秋播草花若在春季播种,也能正常开花。(×)
- 14、百日草、鸡冠花、万寿菊能在 20℃或更高温度下通过春化阶段,进行花芽分化。(√)
- 15、秋植球根花卉,花芽分化的最适温度与花芽生长的最适温度是一致的。(×)
- 16、阳光对花卉生长发育的影响主要表现在三个方面:即光照强度,光照长度和光的组成。(√)
- 17、常春藤、秋海棠属阳性花卉。(×)
- 18、山茶花和杜鹃花属于中性花卉,在给它们浇水时需要遵循“见干见湿”的原则。(√)
- 19、昙花在晚间 12 点以后逐渐开放。(×)
- 20、半枝莲、醉浆草须在强光下才能开放,日落后闭合。(√)
- 21、绿色品种的菊花在花蕾开放时放置于室外,能保持其鲜艳的绿色。(×)
- 22、原产于高纬度地区的植物往往具有中日照的性。(×)
- 23、高山上紫外线强,能促进花青素的形成,故高山花卉色彩更艳丽。(√)
- 24、报春花、彩叶草、凤仙花等播种后不必覆土或稍覆土即可。(√)
- 25、水仙能在清水中生长,主要是靠自身的营养储备来维持生长。(√)
- 26、在花卉栽培中,常采用扣水等措施达到控制营养生长,促进花芽分化。(√)
- 27、土壤的物理性状主要包括土壤质地、结构、孔隙度、酸碱度等。(×)
- 28、沙土类土壤对植物生长有利,适应大部分花卉的要求。(×)
- 29、土壤化学性状主要指土壤的酸碱度、有机质和各种元素含量等。(√)
- 30、在碱性土壤中,不利于锌元素的溶解,导致吸收锌元素过少,影响了叶绿素的合成,产生失绿症。(×)
- 31、山茶花、杜鹃花及蕨类在 PH 值 6、8 以下的土壤中生长良好。(√)
- 32、孢子繁殖在花卉中为蕨类植物所特有。(√)
- 33、蕨类植物除了孢子繁殖外,不能用其他方法繁殖。(×)
- 34、一般种子含水量达到 5%~6%时,可进行贮藏。(√)
- 35、一般花卉种子在充分干燥后密封,存放在低温(0~5℃)条件下,保持其生活

- 力。(√)
- 36、在生长期,截取当年生半木质化带叶的枝条进行扦插,称为绿枝插。(×)
- 37、多浆植物的插条可直接扦插。(×)
- 38、促进插条生根的植物生长激素效果最好的是吲哚丁酸、萘乙酸、吲哚乙酸等。(√)
- 39、嫁接生产上常用既透气又不透水的聚乙烯膜封扎嫁接口和接穗。(√)
- 40、菊花、兰花只能用分株繁殖。(×)
- 41、第一次把花苗移入盆中的操作称为换盆。(×)
- 42、花卉植物在休眠期应少浇水,花芽分化期应多浇水。(×)
- 43、兰科花卉在分株后,新根长出前,可正常浇水。(×)
- 44、亚热带植物越冬一般要求温室不低于 5℃。(×)
- 45、盆花移入温室前,要对温室进行彻底消毒,每 100M² 用 40%福尔马林 500 倍液喷洒。(√)
- 46、植物的自发休眠分为前休眠期、中休眠期、后休眠期三个阶段,都能被唤醒。(√)
- 47、菊花是长日照植物。(×)
- 48、赤霉素有打破休眠促进开花的作用。(√)
- 49、托布津可防治炭疽病、叶斑病、立枯病等多种植物病害。(√)
- 50、代森锌是内吸性杀菌剂。(×)
- 51、职业技能是在职业活动范围内,从业人员需要掌握的操作技能。(×)
- 52、氮肥过多,栽植密度大,温度过低等因素会造成枝叶徒长。(×)
- 53、在我国,有关菊花的最早文字记载距今已有 3000 年的历史。(×)
- 54、芽变是菊花新品种产生的一个重要途径。(√)
- 55、植物的学名是由属名加上种加词及定名人名字或其缩写构成的。(√)
- 56、菊花品种‘太液池荷’、‘梅花鹿’、‘黄香梨’都是平瓣品种。(×)
- 57、在喷洒农药时,人应站在风向上方。(√)
- 58、降低温室空气湿度的主要措施有:进行通风,合理减少灌溉水量,停止喷雾及适当加温。(√)
- 59、多头菊的栽培要选择生长势强、多分枝、节间长、枝条柔性强的品种。(×)
- 60、我国第一部菊花专著是范成大《菊谱》。(×)
- 61、菊花黑斑病是菊花花部病害中较为严重的病害。(×)
- 62、短日照植物在长日照季节进行遮光处理可以促进开花。(√)
- 63、菊花从发芽到开花结实的过程中,对最适温度的要求随发育阶段的不同而改变。(√)
- 64、无土栽培,是指以水、草炭或森林腐叶土、蛭石等介质作植株根系的基质固定植株,植物根系能直接接触营养液的栽培方法。(√)
- 65、由于不良环境如干旱的影响,导致植物生长不良甚至死亡,这一现象称为生理干旱。(×)
- 66、菊花的果实为蒴果,种子短棒状。(×)
- 67、侵染园林植物叶片的重要病害——叶斑病,属于细菌病害。(×)
- 68、温度在 0℃ 以上的低温对植物造成的伤害叫冻害。(×)
- 69、大立菊栽培多选用大菊品种,应选择生长快、生长势强、根系发达、分枝性强、节间长、枝条柔性强的品种。(√)
- 70、蛀干害虫对花卉的危害十分严重,例如月季茎蜂、菊天牛、大丽花螟蛾、线

虫等。(×)

71、尿素施入土壤后必须经过微生物的作用转化为硝态氮才能被植物吸收。

(×)

72、温室湿帘风机系统的使用要点，是在温室开放状态下，防止湿帘堵塞，维护风扇运转正常，达到降温增湿的目的。(×)

73、人工杂交育种是在菊花开花时，由昆虫自然传粉产生种子，用以播种选出新品种的方法。(×)

74、植物扦插时基质温度比气温高则有利于生根。(√)

75、职业道德主要包括社会公德和职业守则。(√)

76、大立菊的绑扎需要在浇水前枝条稍有萎蔫时进行，以防折断枝条。(√)

77、菊花锈病是由锈病病毒引起的。(×)

78、分株繁殖是菊花规模化生产中的主要繁殖方法。(×)

79、植物扦插繁殖中顶端插穗有极性，不论何种扦插方式，总是形态学的上端发芽，下端生根。(√)

80、无土栽培就是营养液栽培。(×)

81、为了避免向光性对花卉生长的影响，室内盆花生长一般采用倒盆措施。(×)

82、生长季节给观赏植物追肥宜在傍晚结合浇水进行，严禁在午间高温时施肥。(√)

83、菊花嫁接要在早晨枝条水分充足时进行。(√)

84、盆栽菊花栽培忌重茬，但用配制的培养土可以避免这个问题。(√)

85、菊花具有散风清热、平肝明目、清热解毒的功效。(√)

86、栽培菊花一般为六倍体或非整倍体。(√)

87、花坛施工时，若宿根花卉与一、二年生花卉混栽，应先栽宿根花卉，后栽一、二年生草花。(√)


88、氮、磷、钾被称为植物肥料“三要素”。(√)


89、确定花卉种子采收时间，生产上多以生理成熟作为种子成熟的标记。(×)

90、切花菊在采条、修剪时对所用工具消毒可以减轻菊花细菌性枯萎病的危害。(√)

二、花卉识别

序号	名称	参考图	序号	名称	参考图
1	碧桃		2	三角梅	
3	紫薇		4	毛杜鹃	
5	彩叶草		6	月季	
7	新几内亚凤仙花		8	炮仗花	
9	山茶(茶花)		10	金鱼草	
11	孔雀草(红黄草)		12	鸡冠刺桐	

序号	名称	参考图	序号	名称	参考图
13	红绒球 (朱缨花)		14	红花鸡蛋花	
15	翠芦莉		16	含笑	
17	龙船花		18	虎刺梅 (铁海棠)	
19	绣球花		20	夏堇	
21	栀子		22	南天竹	
23	苏铁		24	肾蕨	

序号	名称	参考图	序号	名称	参考图
25	美人蕉		26	虞美人	
27	夹竹桃		28	荷花	
29	细叶萼距花		30	鸡冠花	
31	千屈菜		32	郁金香	
33	银杏		34	一品红	
35	蝴蝶兰		36	朱顶红	

序号	名称	参考图	序号	名称	参考图
37	孔雀竹芋		38	白兰	
39	二乔玉兰		40	四季秋海棠	
41	梅花		42	龙吐珠	
43	醉蝶花		44	波斯菊	
45	木芙蓉		46	木槿	
47	茉莉花		48	水仙花	

序号	名称	参考图	序号	名称	参考图
49	迎春花		50	桔梗	
51	矮牵牛		52	三色堇	
53	百日草(百日菊)		54	千日红	
55	一串红		56	鸢尾	
57	石竹		58	萱草	
59	白掌		60	红掌(花烛)	

序号	名称	参考图	序号	名称	参考图
61	马缨丹(五色梅)		62	红叶石楠	
63	银叶金合欢		64	非洲凌霄	
65	木棉		66	紫荆(满条红)	
67	台湾栾		68	硬枝黄蝉	
69	琴叶珊瑚		70	八角金盘	
71	金叶假连翘		72	特丽莎香茶菜	

序号	名称	参考图	序号	名称	参考图
73	墨西哥鼠尾草		74	白花洋紫荆	
75	合欢		76	花叶印度榕	
77	马褂木 (鹅掌楸)		78	金叶千层	
79	琴叶榕		80	巴西野牡丹	
81	芦苇		82	蓝花楹	

序号	名称	参考图	序号	名称	参考图
83	金钱树 (雪铁芋)		84	旱金莲	
85	旱伞草		86	花叶蔓长春	
87	玫瑰竹芋		88	丹桂	
89	网纹草		90	金边常春藤	
91	黄花风铃木		92	黄金榕	

序号	名称	参考图	序号	名称	参考图
93	紫花马缨丹		94	发财树	
95	福建山樱花		96	金花茶	
97	美花红千层		98	倒挂金钟	
99	文竹		100	红花羊蹄甲	